Ausbreitung von Ungräsern nimmt zu!

Einwanderung von Nachbarflächen (Samenzuflug)

Verschleppung durch Lohndrusch, Bodenbearbeitungsgeräten

syngenta

Ungräserarten im Getreide in Österreich

Gemeiner Windhalm



Ackerfuchs-schwanz

Flughafer

Weidelgras Arten

Trespen Arten

Verbreitung	sehr breit	regional (OÖ,NÖ)	regional (NÖ)	regional	regional häufig
Schadwirkung	mittel	sehr hoch	mittel	hoch	hoch
Bekämpfbarkeit	leicht	schwer	leicht	mittel – schwer	schwer
Resistenzrisiko	mittel	hoch	gering	hoch	mittel
Zukünftige Bedeutung	gleich	steigend	gleich – weniger	steigend	gleich - steigend

syngenta

Getreideherbizide auf einem Blick



syngenta

Eindrücke aus der Saison 2020 Wachstumsreglereinsatz: Moddus® zeigt überlegene Dauerwirkung



Versuchsstandort Kleinebersdorf (Niederösterreich), Wintergerste Sandra, Aufnahme vom 24.06.2020

syngenta

Für die gesunde Halmbasis & Mehltau (Indikationserweiterung)

Unix®

Tern®

	Pfl.Reg. Nr. 3869	Pfl.Reg.Nr: 4149
Wirkstoffe	Cyprodinil 750 g/l	Fenpropidin 750 g/l
Wirkstoffgruppe	Anilinopyrimidin	Morpholin
Formulierung	WG	EC
Kulturen	**Weizen, Gerste, Roggen, Triticale**	**Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hafer**
Wirkungsspektrum	Halmbruch, Echter Mehltau, Rhynchosporium, Netzflecken**, Rhizoctonia**	Echter Mehltau
Anwendungsfenster	Weizen: BBCH, 30-55 Roggen, Triticale: BBCH 30-32, Gerste: BBCH 30-51	BBCH 31-65
Max. Aufwandmenge	1,0 kg/ha (0,6 kg/ha Praxisaufwandmenge)	0,75 l/ha (0,5 l/ha Praxisaufwandmenge)
Anzahl Anwendungen	1	Max. 2 (Triticale max. 1)
Abstandsauflagen	5/1/1/1	-/20/10/5
Wartefrist	---	42 Tage
Gebinde	5 kg	5 Liter

** Eigene Erfahrungen

syngenta

Elatus® Era Folpan®

Für optimalen Rund-um-Schutz

Neu!

	Elatus Era	Folpan 500 SC
Wirkstoffe	Solatenol, Prothioconazol	Folpet
Wirkm. (FRAC)	7, 3	M 4
Formulierung	Emulsionskonzenrat (EC)	Suspensionskonzentrat (SC)
Kulturen	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hafer	Weizen*
Anwendung	Weizen, Triticale und Roggen: BBCH 31-69 Gerste und Hafer: BBCH 31-59	Weizen: BBCH 30-59
Aufwandmenge	0,8 l/ha	1,2 l/ha
Wartezeit	42 Tage	
Abstandsauflagen	10/10/10/10	
Packung	5 l Elatus Era + 7,5 l Folpan 500 SC	

* Zulassung (Gefahr in Verzug) für Gerste gegen Ramularia wird erwartet.

syngenta

Saison 2020 - Fazit

Ausgeprägte **Frühjahrstrockenheit** bis Mai

→ **Langsame** Infektionszunahme

Krankheiten verspätet aufgetreten und teilweise auf niedrigem Niveau

Braunrost und **Ramularia** waren die dominierenden Krankheiten

Mehltau, Septoria und Netzflecken abhängig von Sorte und Umwelt

Elatus™ Era bestätigt Nr. 1 Leistung!

Fungizideinsatz führte zu Mehrertrag und Mehrerlös

Schwerpunkte 2021

Breit wirksam in allen Kulturen: **Elatus Era**

Für noch mehr Leistung bei Ramularia in Gerste: **Elatus Era Folpan**

Unix: der Spezialist gegen Halmbruch, inkl. Rhynchosporium, Netzflecken sowie Basisschutz gegen Mehltau

Tern: Zuverlässiger Mehltauschutz

Elatus™ Era

Tern®

Unix®

Mit der Kompetenz von Syngenta erfolgreich in die Saison 2021

syngenta

Wintergerste Ramularia 2020 St. Pölten

Kontrolle

VGM R 1,0 l/ha

Elatus Era+Folpan 1.0+1.5 l/ha

über 7 Wochen nach Applikation!

Quelle: **St. Pölten** (AT), Arcanda, 2020
Fotos: 24.06.2020 (Vorlage mit Unix/Tern)

syngenta

Abreifeschutz Weizen 2020 Septoria

FTWH040D-2020AT St. Valentin

Kontrolle

VGM R 1.5 l/ha

Elatus Era 1.0 l/ha

Quelle: **St. Valentin** (AT), Pedro, 2020
Fotos: 02.07.2020 (Vorlage mit Unix/Tern)

syngenta

Abreifeschutz Weizen 2020 Braun-Rost

FTWH010D-2020AT Harmannsdorf

Kontrolle

8 Wochen nach Applikation!

VGM R 1.5 l/ha

Elatus Era 1.0 l/ha

Quelle: **Harmannsdorf** (AT), Element, 2020
Fotos: 06.07.2020

syngenta

Einsatzempfehlung 2021



* Zulassung eines geeigneten Kontaktfungizides wird erwartet.